

# OxyContin: Ser vi amerikanske trender i Norge?

Svetlana Skurtveit, PhD, professor  
Folkehelseinstitutt  
Universitetet i Oslo

Fagkonferanse Actis 22.04.2022



POINT

Preventing an Opioid epidemic In Norway:  
Focusing on Treatment of chronic pain



# Bakgrunn


## POINT

Preventing an Opioid epidemic In Norway:  
Focusing on Treatment of chronic pain

- Opioidepidemi i USA
- Trender i Norge
- Kroniske smertepasienter trenger god behandling

# POINT

Preventing an Opioid epidemic In Norway:  
Focusing on Treatment of chronic pain





# Opioidbruk i den generelle befolkningen

Utleveringsår	Antall opioidbrukere	Andel brukere (%)
2010	489 110	10,0
2011	497 462	10,0
2012	511 013	10,2
2013	525 383	10,3
2014	537 376	10,5
2015	550 026	10,6
2016	559 039	10,7
2017	563 222	10,7
2018	560 378	10,5
2019	561 917	10,5
2020	552 409	10,3
2021	569 611	10,5


Norge har det høyeste antall opioidbrukere i forhold til befolkningstallet i Skandinavia.

# Svake opioidider



— Kodein og paracetamol (N02AJ06) — Tramadol (N02AJ13, N02AX02) — Totalt

# Sterke opioider



- Totalt
- Oksykodon (N02AA05, N02AA55)
- Buprenorfin (N02AE01)
- Fentanyl (N02AB03)
- Morfin (N02AA01)
- Ketobemidon (N02AB01)

# Ulike pasientgrupper som blir behandlet med opioider

- Blåreseptordningen
  - Palliativ behandling (lindrende behandling ved uhelbredelig sykdom)
  - Langvarige, ikke-kreftrelaterte smerter
- Hvite resepter (normalresepter)
  - Ingen informasjon om indikasjon i Reseptregisteret


## Ulike pasientgrupper som ble behandlet med opioider i 2019

De fleste får opioider på hvit resept og mange får bare én resept

	Antall	Andel (%)
<b>Totalt</b>	561 917	100
<b>Hvit resept</b>	524 193	93,3
<b>Palliativ behandling (blå)</b>	19 740	3,5
<b>Langvarige smerter (blå)</b>	17 378	3,1



# Utvikling i antall langvarige opioidbrukere




2010: 49993

2019: 59996


10,0 – 10,7 % av alle  
opioidbrukere i 2010  
og 2019 var vedvarende  
brukere

# Samtidig bruk av andre vanedannende stoffer (benzodiazepiner (BZD) og z-hypnotika)



Langvarig opioidbrukere – hvit resept og langvarig smerte (blå)

# Narkotikautløste dødsfall 2010-2019



# Konklusjon

Den totale opioidbruken har ligget stabilt på cirka 10 % (ca. 550 000 personer) av befolkningen.

Bruken av det sterke opioidet oksykodon har økt kraftig. Rundt 70 000 personer fikk utlevert oksykodon i 2021.

Antall langvarige opioidbrukerne har økt og i 2019 var rundt 60 000 personer langvarige brukere.

# Konklusjon

I strid med anbefalinger ble en høy andel (60 %) av de langvarige opioidbrukerne også behandlet med andre vanedannende legemidler i 2019.

Det har vært en økning i antall overdosedødsfall som skyldes forskrevne opioider.

Vi har ikke en økning i totalbruken av opioider i Norge, men det er noen trender vi må følge veldig nøye med på.

**Vi har foreløpig ikke en opioidepidemi i Norge.**